

## 通知

# 关于新冠疫苗 第三针接种

为何需要疫苗接种？

接种疫苗后抗体会随着时间延长  
而逐步下降

接种疫苗后虽然有很高的预防效果，但随着  
时间延长 效果 会逐步下降。

为提高效果，请接种第 3 针疫苗。

对奥密克戎变异株预防效果  
第二针接种后

65~70%

2~4周后

約15%  
25周后

对象


第二针 接种后 间隔 5 个月以上 且 12 岁以上

费用

免费 ¥ 0

地点

居住地 市町村 会场・医院



接种疫苗的有效性

第 3 针接种后 能明显的预防传染效果

第 3 针接种疫苗 对 新冠感染及 新冠感染后发生重症率 有显著 预防效果。

疫苗接种能 混打吗？

第 1・2 针不同疫苗也有效且安全

第 3 针可接种和第 1・2 针不同的疫苗。

不同的疫苗混打也有效且安全。

辉瑞疫苗及  
莫德纳疫苗  
请尽早接种疫苗

接种的安全性

## 第3针接种副作用第2针后几乎相同

无论接种第3针辉瑞疫苗及莫德纳疫苗后副作用几乎和第2针相同。

莫德纳疫苗第3针剂量是第1·2针一半的量，且症状减少。



- ◆ 即便感染新冠后也请接种第3针。
- ◆ 接种疫苗后为确保不被感染请做好防范。
- ◆ 请勿强制周围人接种疫苗。
- ◆ 请勿歧视无接种者。

如有疑问，请拨打电话咨询（电话是收费电话）。

关于接种券 预约 会场·医院	居住地 的 市政府
关于疫苗 接种后症状等	群马新冠疫苗专线 <b>0570-783-910</b> （24小时 19种语言）
其他有关咨询	群马外国人综合咨询中心 <b>027-289-8275</b> (星期一~星期五 9:00~17:00 5种语言)
疫苗详情	厚生劳动省  群马县 

尚未接种第1·2者也是免费接种疫苗。